


# Föreläsning 12

SF1633 Differentialekvationer MT16 Kurt Johansson

## Fouriersonser

Enkel harmonisk svängning med frekvensen  $f$ :

○  $a_n \sin 2\pi f t$  eller  $b_n \cos 2\pi f t$




○ Period =  $T = 2p$  , Frekvens  $f = \frac{1}{T}$

○ Vinkelrekvens  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

○ Den grundläggande idén i Fourieranalys är att (i princip) varje periodisk funktion med perioden  $T$  kan skrivas som en (oändlig) summa av enkla harmoniska svängningar med frekvenser  $f_n = n f = n/T$ ,  $n \geq 0$ , som är multiplar av en grundfrekvens  $f$ .

$$g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n 2\pi}{T} t + b_n \sin \frac{n 2\pi}{T} t \right) \quad (1)$$

Detta gäller under vissa förutsättningar på  $f$  och man måste fundera lite över i vilken mening vi har likhet i (1). Konvergensen av serien är inte självklar.



Givet  $f(t)$  hur kan vi bestämma  $a_n$  och  $b_n$ ?

De frekvenser  $f_n = nF$  som finns med i (1) kallas spektrum för  $g$  och vi talar också om frekvensanalys.  $a_n$  och  $b_n$  anger hur mycket det finns med av varje frekvens.

$$a_n \cos \frac{n2\pi}{T} t + b_n \sin \frac{n2\pi}{T} t = c_n \sin \left( n \cdot \frac{2\pi}{T} t + \varphi_n \right)$$

↑  
amplitud


↑  
fas

(1) kallas en Fourierserie och vi säger att vi utvecklar  $g$  i en Fourierserie. Koefficienterna  $a_n$  och  $b_n$  kallas Fourierkoefficienter.

$a_n$  och  $b_n$  kan bestämmas genom att utnyttja ortogonalitet.

# Skalarprodukt

Låt  $x_k$  vara ett observerat värde av något vid tiden  $t_k = k/n$ ,  $1 \leq k \leq n$ .



Låt  $y_k$  vara ett annat observerat värde vid tiden  $k/n$ ,  $1 \leq k \leq n$ . Vi får två vektorer i  $\mathbb{R}^n$

$$\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

Antag att  $x_k$  och  $y_k$  ges av funktioner

$$x_k = f\left(\frac{k}{n}\right), \quad y_k = g\left(\frac{k}{n}\right)$$

Skalarprodukten (eller inre produkten) av  $\bar{x}$  och  $\bar{y}$  är

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = (\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{k=1}^n x_k y_k = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right)$$

Medelvärdet är

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(t) g(t) dt$$

( $f, g$  kont.)

Konvergens av en Riemansumma.

Vi tar högerledet som definitionen av skalärprodukten eller inre produkten av de två funktionerna på  $[0,1]$ .

Def. Inre produkten av två funktioner  $f, g$  på  $[a, b]$  definieras genom

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Funktionerna  $f$  och  $g$  är ortogonala om

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx = 0.$$

Ex. Polynomen  $p_1(x) = x$  och  $p_2(x) = 5x^3 - 3x$  är ortogonala på  $[-1, 1]$ .

$$\int_{-1}^1 x(5x^3 - 3x)dx = \int_{-1}^1 5x^4 - 3x^2 dx = \left[ x^5 - x^3 \right]_{-1}^1$$

$$= 1 - 1 - ((-1) - (-1)) = 0.$$

För en vektor  $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$  ges normen (längden)  $\|\bar{x}\|$  av

$$\|\bar{x}\|^2 = \bar{x} \cdot \bar{x} = \sum_{k=1}^n x_k^2$$

På samma sätt definierar vi normen av funktionen  $f$  på  $[a, b]$  genom



$$\|f\|^2 = (f, f) = \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Ex. Normen av  $p_1(x) = x$  på  $[-1, 1]$  fås ur

$$\|p_1\|^2 = \int_{-1}^1 p_1(x)^2 dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

$$\|p_1\| = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Def.  $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots\}$  är en ortogonal mängd av funktioner på  $[a, b]$  om de är parvis ortogonala,

$$\int_a^b \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx = 0 \text{ för alla } m \neq n,$$

Det är en ortonormal mängd om dessutom  $\|\varphi_n\| = 1$  för varje  $n \geq 0$ .

Ex.  $\{1, \cos x, \cos 2x, \dots\}$  är en ortogonal mängd på  $[-\pi, \pi]$ .

$$\varphi_n(x) = \cos nx, \quad n \geq 0. \text{ Låt } m \neq n,$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m+n)x + \cos(m-n)x dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{m+n} \sin(m+n)x + \frac{1}{m-n} \sin(m-n)x \right]_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

ty  $\sin k\pi = 0$  för varje  $k \in \mathbb{Z}$ .

$$\|\varphi_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos 2nx}{2} \, dx = \pi$$

$$\|\varphi_n\| = \sqrt{\pi}, \quad n \geq 1, \quad \|\varphi_0\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2\pi.$$

$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2x, \dots \right\}$  är en ortonormal mängd.

Kommentar: Mängden av alla funktioner  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  sådana att

$$\|f\|^2 = \int_a^b f(x)^2 \, dx < \infty$$

bildar ett vektorrum av funktioner på  $[a, b]$  som kallas

$L^2[a, b]$  (" $L^2$ -rummet"). På detta rum har vi

en inre produkt (skalärprodukt) som vi definierat ovan.

Avståndet mellan två funktioner  $f$  och  $g$  definieras genom

$$\|f - g\| = \left( \int_a^b (f(x) - g(x))^2 \, dx \right)^{1/2}.$$

Detta är ett oändligt dimensionellt vektorrum. Dimensionen  $n$

av  $\mathbb{R}^n$  är lika med det maximala antalet linjärt oberoende

vektorer  $n$  kan ha. I  $L^2[-\pi, \pi]$  är  $1, \cos x, \cos 2x, \dots$

en oändlig följd av linjärt oberoende vektorer. └

Om  $\varphi_n(x), n \geq 0$ , är en ortogonal följd (mängd) av funktioner på  $[a, b]$  är det en intressant fråga om vi kan skriva en given funktion  $f(x)$  på  $[a, b]$  som en serie (oändlig linjärkombination):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(x). \quad (\text{"expansion i ortogonal bas"})$$

Da är

$$\int_a^b f(x) \varphi_m(x) dx = \int_a^b \left( \sum_{n=0}^{\infty} c_n \varphi_n(x) \right) \varphi_m(x) dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \underbrace{\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx}_{\substack{= 0 \text{ om } n \neq m \\ = \|\varphi_m\|^2 \text{ om } n=m}}$$

ej självklart!

Alltså måste vi ha

$$c_n = \frac{1}{\|\varphi_n\|^2} \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2}$$

(jfr. linjär algebra)

## Fourierserier

$\left\{ 1, \cos \frac{\pi x}{p}, \sin \frac{\pi x}{p}, \cos \frac{2\pi x}{p}, \sin \frac{2\pi x}{p}, \dots \right\}$  är en

ortogonal mängd på  $[-p, p]$ . Visas helt analogt med fallet  $\{1, \cos x, \cos 2x, \dots\}$  ovan,

$$\int_{-p}^p \cos \frac{m\pi x}{p} \cos \frac{n\pi x}{p} dx = 0 \quad \text{om } m \neq n$$

$$\int_{-p}^p \cos \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi x}{p} dx = 0 \quad \text{allt } m, n$$

$$\int_{-p}^p \sin \frac{m\pi x}{p} \sin \frac{n\pi x}{p} dx = 0 \quad \text{om } m \neq n$$

Dessutom ges momenta i kvadrat av

$$\int_{-p}^p \cos^2 \left( \frac{m\pi x}{p} \right) dx = p \quad ; \quad \int_{-p}^p \sin^2 \left( \frac{m\pi x}{p} \right) dx = p, \quad m \geq 1$$

$$\int_{-p}^p 1 dx = 2p$$

Om  $f(x)$ ,  $x \in [-p, p]$  ges av den trigonometriska serien

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x \right) \quad (1)$$

bor vi alltid ha att



$$a_n = \frac{1}{P} \int_{-P}^P f(x) \cos \frac{n\pi}{P} x dx, \quad n \geq 1 \quad (2)$$

$$b_n = \frac{1}{P} \int_{-P}^P f(x) \sin \frac{n\pi}{P} x dx, \quad n \geq 1 \quad (3)$$


$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2P} \int_{-P}^P f(x) \cdot 1 dx \Rightarrow a_0 = \frac{1}{P} \int_{-P}^P f(x) dx \quad (4)$$

(dvs. (2) med  $n=0$ ; därtill skriver vi  $a_0/2$  i (1).)

$a_n$  och  $b_n$  kallas Fourierkoefficienterna för funktionen  $f$  på  $[-P, P]$ , och (1) kallas Fourierserien för  $f$  på  $[-P, P]$ . I (1) har vi utvecklat/expanderat  $f$  i en Fourierserie på intervallet  $[-P, P]$ .

Ex. Låt

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{om } 0 < x \leq \pi \\ 0 & \text{om } -\pi < x \leq 0 \end{cases}$$



Bestäm Fourierserien för  $f$ .  $P = \pi$ . Om  $n \neq 0$  är

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$\stackrel{n \neq 0}{=} \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi n} (\sin n\pi - \sin 0) = 0.$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx = 1$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx \stackrel{n \neq 0}{=} \frac{1}{\pi} \left[ -\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi n} [-\cos n\pi + \cos 0] = \frac{1}{\pi n} (1 - (-1)^n)$$

Fourierserien blir

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi n} (1 - (-1)^n) \sin nx \stackrel{?}{=} f(x), \quad x \in [-\pi, \pi]$$

↑ Har vi likhet här?

Om vi inte vet att vi har likhet skriver vi ibland

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi n} (1 - (-1)^n) \sin nx$$

Det är inte självklart att vi har likhet och inte alltid sant.

Skriv

$$f(x+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x+h)$$

högergränsvärde i  $x$   
(om det existerar)

$$f(x-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} f(x+h)$$

vänstergränsvärde i  $x$   
(om det existerar)

I exemplet är  $f(0+) = 1$ ,  $f(0-) = 0$ .


Om  $f$  är kontinuerlig i  $x$  så är

$$f(x) = f(x+) = f(x-).$$

Sats Om  $f$  och  $f'$  är styckvis kontinuerliga i  $[-p, p]$  så konvergerar Fourierserien mot  $f(x)$  om  $x$  är en kontinuitetspunkt och mot

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$$

i en diskontinuitetspunkt



I exemplet gäller

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin nx = \begin{cases} 1 & \text{om } 0 < x < \pi \\ 1/2 & \text{om } x = 0 \\ 0 & \text{om } -\pi < x < 0 \\ 1/2 & \text{om } x = \pm\pi \end{cases}$$

Antag att  $f$  är definierad i  $[-p, p]$  och att

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{p} x + b_n \sin \frac{n\pi}{p} x), \quad (5)$$

$x \in [-p, p]$ .

Dä är högra ledet i (5) en periodisk funktion med period  $2p$ , ty


$$\cos \frac{n\pi}{p}(x+2p) = \cos\left(\frac{n\pi}{p}x + 2n\pi\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{p}x\right)$$

och motsvarande för sinus. Om vi utvidgar  $f$  till en periodisk funktion på  $\mathbb{R}$  genom att kräva

$$f(x+2p) = f(x), \text{ för alla } x \in \mathbb{R}$$

Så gäller (5) för alla  $x \in \mathbb{R}$ .


I exemplet:



fyrkantpuls  
(koppla av och på  
spänning)

Ex. Låt

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$



$$p=1$$

$$\text{period } T = 2p = 2$$

Bestäm Fourierserien för  $f$ . Vi får



$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx = \int_{-1}^0 (1+x) \cos n\pi x dx + \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx$$

$\Gamma$   $x = -t$  i första integralen ger

$$\int_{-1}^0 (1+x) \cos n\pi x dx = \int_0^1 (1-t) \cos n\pi (1-t) dt = \int_0^1 (1-t) \cos n\pi t dt$$

$$= 2 \left[ (1-x) \frac{\sin n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 \frac{\sin n\pi x}{n\pi} dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx$$

↑  
partiell  
integration

$$= \frac{2}{n\pi} \left[ -\frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{2(1-(-1)^n)}{n^2\pi^2} \quad \text{om } n \neq 0$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 1-x dx = 2 \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1$$

$$b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin n\pi x dx = 0$$

—  
udda funktion

ty  $f$  jämn och  $\sin n\pi x$   
udda

Alltså gäller enligt satsen

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1-(-1)^n)}{n^2\pi^2} \cos n\pi x \quad \text{för } x \in [-1, 1].$$

Speciellt kan vi sätta  $x=0$  vilket ger

$$1 = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1-(-1)^n)}{n^2 \pi^2}$$

$$1-(-1)^n = \begin{cases} 0 & \text{om } n \text{ jämnt} \\ 2 & \text{om } n \text{ udda} \end{cases}$$

⊆ Alla udda tal kan skrivas  $n=2k+1$ ,  $k=1,2,\dots$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^2 (2k+1)^2} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

drs.

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$