


F18 Ytintegraler och Divergenssatsen

Låt $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ och $\gamma \subset \Omega$ vara en orienterad kurva med parametriseringen $r: [a, b] \rightarrow \gamma$.



Kurvintegralen av u längs γ definieras som



$$\begin{aligned} \int_{\gamma} u(r(t)) \cdot r'(t) dt &= \int_{\gamma} u(r(t)) \cdot \underbrace{\frac{r'(t)}{|r'(t)|}}_{T(t)} \underbrace{|r'(t)| dt}_{\text{bågelementet } ds} \\ &= \int_{\gamma} u(r(t)) \cdot T(t) ds \end{aligned}$$

Ytintegraler:

Låt $Y \subset \mathbb{R}^3$ vara en yta med parameterframställningen $r: D \rightarrow Y$, $D \subset \mathbb{R}^2$.




Ex: Sfären $r(\theta, \varphi) = (R \cos \varphi \sin \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \theta)$
 $0 \leq \varphi < 2\pi$, $0 < \theta < \pi$.

$$N(\theta, \varphi) = r'_\theta \times r'_\varphi = R \sin \theta \, r(\theta, \varphi)$$

Låt N vara enhetsnormalen av ytan, dvs

$$N(s,t) = \frac{r'_s \times r'_t}{|r'_s \times r'_t|}.$$



Flödesintegralen definieras nu som $\iint_Y u \cdot N \, dS$


där $dS = |r'_s \times r'_t| \, ds \, dt$ är areaelementet.

$$\begin{aligned} \iint_Y u \cdot N \, dS &= \iint_D \left(u(r(s,t)) \cdot \frac{r'_s \times r'_t}{|r'_s \times r'_t|} \right) |r'_s \times r'_t| \, ds \, dt \\ &= \iint_D u(r(s,t)) \cdot (r'_s \times r'_t) \, ds \, dt. \end{aligned}$$

Ex: Bestäm flödet av $u(x,y,z) = (y^3, z^2, x)$ nedåt genom den del av ytan $z = 4 - x^2 - y^2$ som ligger ovanför $z = 2x + 1$.

$$r(s,t) = (s, t, 4 - s^2 - t^2)$$

$$\begin{aligned} N(s,t) &= \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 0 & -2s \\ 0 & 1 & -2t \end{vmatrix} \\ &= (2s, 2t, 1) \end{aligned}$$



$$\begin{cases} z = 4 - x^2 - y^2 \\ z = 2x + 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} 4 - x^2 - y^2 &= 2x + 1 \\ \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 &= 4 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow (x+1)^2 + y^2 = 4.$$

Ansön $r: D \rightarrow Y$ där $D = \{(s,t): (s+1)^2 + t^2 \leq 4\}$.

Vi får

$$\Phi_v = \iint_Y u \cdot N \, dS = \iint_D u(r(s,t)) \cdot (2s, 2t, 1) \, ds \, dt$$

$$= \iint_{(s+1)^2 + t^2 \leq 4} u(s, t, 4-s^2-t^2) \cdot (2s, 2t, 1) \, ds \, dt$$

$$= \iint_{(s+1)^2 + t^2 \leq 4} (t^3, (4-s^2-t^2)^2, s) \cdot (2s, 2t, 1) \, ds \, dt$$

$$= \iint_{(s+1)^2 + t^2 \leq 4} (2st^3 + 2t(4-s^2-t^2)^2 + s) \, ds \, dt \overset{\text{udda i } t}{=} \iint_{(s+1)^2 + t^2 \leq 4} s \, ds \, dt$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} x = s+1 \\ y = t \end{array} \right\} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x-1) \, dx \, dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 4} dx \, dy = \underline{\underline{-\pi \cdot 4}}$$

$$\Phi_N = -\Phi_v = \underline{\underline{4\pi}}.$$

Definition: Låt $u: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $D \subset \mathbb{R}^3$ vara ett vektorfält av klass C^1 . Då definieras divergensen av u som

$$\operatorname{div} u = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3}.$$

Ex: $u(x) = (x_2^2 x_1, x_1 x_3, \sin x_3)$

$$\operatorname{div} u = x_2^2 + 0 + \cos x_3 = x_2^2 + \cos x_3.$$

Notera att $(\operatorname{div} u): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

Öppningsatsen: (Gauss sats)


Låt $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ vara ett C^1 -fält. Om det kompakta området K har en rand ∂K som består av en eller flera C^1 -ytor med utåtriktad enhetsnormal N så

$$\iint_{\partial K} u \cdot N \, dS = \iiint_K \operatorname{div} u \, dx \, dy \, dz$$

Beris: I specialfall att det finns φ, ψ och D så att
 $K = \{(x, y, z) : \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y), (x, y) \in D\}$

Låt oss visa att

$$\iint_{\partial K} (0, 0, u_3) \cdot N \, dS = \iiint_K \frac{\partial u_3}{\partial z} \, dx \, dy \, dz$$



$$HL = \iiint_K \frac{\partial u_3}{\partial z} \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left[u_3 \right]_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} \, dx \, dy$$

$$= \iint_D (u_3(x, y, \psi(x, y)) - u_3(x, y, \varphi(x, y))) \, dx \, dy$$

Flödesintegralen längs sidan har normalvektor där z komponenten är 0. Alltså är $(0, 0, u_3) \cdot N = 0$.

$$\oint_{\gamma_\psi} (0, 0, u_3) \cdot (-\psi'_x, -\psi'_y, 1) \, dx \, dy = \iint_D u_3(x, y, \psi(x, y)) \, dx \, dy$$

$$\Phi_{\gamma\varphi} = \iint_D (0, 0, u_3) \cdot (\varphi'_x, \varphi'_y, -1) dx dy = - \iint_D u_3(x, y, \varphi(x, y)) dx dy$$

Analogt kan vi visa att

$$\iint_{\partial K} (0, u_2, 0) \cdot N dS = \iiint_K \frac{\partial u_2}{\partial y} dx dy dz$$


$$\iint_{\partial K} (u_1, 0, 0) \cdot N dS = \iiint_K \frac{\partial u_1}{\partial x} dx dy dz$$

$$\text{Tillsammans} \quad \iint_{\partial K} u \cdot N dS = \iiint_K \operatorname{div} u dx dy dz$$

Ex: Beräkna flödet av vektorfältet $F(x, y, z) = (x^3 y, yz, xz)$ ut genom sfären med centrum i $(1, 0, 1)$ och radie 1.

Lösning: Divergenssatsen ger

$$\Phi = \iiint_K (3x^2 y + z + x) dx dy dz$$



$$K = \{ (x, y, z) : (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1 \}$$

$$\Phi = \iiint_K (x+z) dx dy dz = 2 \iiint_K x dx dy dz = \{ x-1 = u \}$$

$$= 2 \iiint_{u^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1} (1+u) du dy dz = 2 \iiint_{u^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1} du dy dz = \frac{8\pi}{3}$$

Ex: Bestäm volymen av den kon som har basarea A och höjd h .

Lösning:

Strövara fältet $u = (x_1, x_2, x_3)$.

$$\operatorname{div} u = 1 + 1 + 1 = 3.$$

$$\mu(K) = \iiint_K dx dy dz =$$

$$= \frac{1}{3} \iiint_K \operatorname{div} u \, dx dy dz = \frac{1}{3} \iint_{\partial K} u \cdot N \, dS = \frac{1}{3} \iint_{Y_1} (x_1, x_2, x_3) (0, 0, 1) \, dS$$

$$+ \frac{1}{3} \iint_{Y_2} \underbrace{x \cdot N_2}_{=0} \, dS = \frac{1}{3} \iint_{Y_1} h \, dx dy + 0 = \frac{hA}{3}.$$

